

**Liste der genehmigten Pflanzenschutzmittel im geförderten Steillagenweinbau 2023**  
(Stand: Mai 2023)

<b>FUNGIZIDE</b>					
Indikation/Produktname	Anwendung mit		Raub- Milben- klasse <sup>1</sup>	Anwendungen	
	Hub- schrauber	Drohne		Vorblüte (ES 01-60)	Nachblüte (ES 61-81)
<b>Falscher Mehltau - <i>Peronospora</i> (<i>Plasmopara viticola</i>)</b>					
<b>Schwarzfleckenkrankheit - <i>Phomopsis</i> (<i>Phomopsis viticola</i>)</b>					
<b>Roter Brenner (<i>Pseudopezicula tracheiphila</i>)</b>					
Delan WG Delan Pro <sup>4)</sup>	ja ja	nein ja	I I	insgesamt max. 8 Anw. gegen alle Schaderreger Delan Pro max. 4 Anwendungen	
Afrasa Triple WG <sup>4)</sup> Aktuan <sup>3)</sup>	nein nein	nein nein	III I	insgesamt max. 2 Anw. gegen alle Schaderreger, Afrasa Triple WG bis ES 75	
Flint <sup>3)</sup>	nein	nein	I	insgesamt max. 2 Anw. gegen alle Schaderreger	
Dynali <sup>6)</sup>	ja	ja	I	insgesamt max. 2 Anw. gegen alle Schaderreger	
Enervin SC <sup>4)9)</sup> Enervin F <sup>4)</sup> Orvego <sup>4)</sup>	ja nein ja	ja nein ja	II II II	insgesamt max. 3 Anw. gegen alle Schaderreger, Enervin F und Enervin SC max. 2 Anwendungen	
Folpan 80 WDG Folpan 500 SC Flovine Vinofol SC Solofol <sup>4)</sup>	ja nein ja nein ja	ja nein ja nein ja	I I I I II	insgesamt max. 8 Anw. aus dieser Mittelgruppe, Solofol bis ES 79	
Ampexio <sup>4)</sup> Forum Star <sup>4)</sup> Forum Gold <sup>4)</sup> Melody Combi Metomor F <sup>4)</sup> Orvego <sup>4)</sup> Pergado <sup>4)</sup> Vinostar <sup>4)</sup>	nein ja nein nein nein ja nein ja	nein ja nein nein nein ja nein ja	I I I III II II I I	insgesamt max. 3 Anw. aus dieser Mittelgruppe, Forum Gold nur bis ES73 <b>Aufbrauchfrist Forum Star bis 30.06.24</b>	
Polyram WG	nein	nein	II	insgesamt max. 3 Anw. gegen alle Schaderreger	
Mildicut (008113-00) <sup>4)</sup> Sanvino <sup>4)</sup> Videryo F <sup>4)</sup>	ja nein nein	ja nein nein	I I I	max. 3 Anw. aus dieser Mittelgruppe	
Airone SC <sup>2) 4)</sup> Funguran progress <sup>2) 4)</sup> Coprantol duo <sup>2) 4)</sup> Cuprozin progress <sup>2) 7)</sup> Cuproxtat <sup>2) 4)</sup> Grifon SC <sup>2) 4)</sup>	nein ja nein ja nein nein	nein ja nein ja nein nein	I I I I II I	insgesamt max. 2 Anw. aus dieser Mittelgruppe gegen alle Schaderreger, siehe auch Zusatzbestimmungen	
Fantic F <sup>4)</sup>	nein	nein	I	insgesamt max. 2 Anw. aus dieser Mittelgruppe,	
Profiler <sup>4)</sup>	ja	nein	I	max. 1 Anwendung, nur bis ES73	
Zorvec Zelavin <sup>4)9)</sup> Zorvec Zelavin Bria <sup>4)</sup> Zorvec Vinabel <sup>4)</sup>	ja nein ja	ja nein ja	I I I	Insgesamt max. 1 Anw. aus dieser Mittelgruppe, nur bis ES75	
Alginure BioSchutz <sup>4)9)</sup> Foshield <sup>4)9)</sup> Frutogard <sup>4)9)</sup> Phosfik <sup>4)9)</sup> Veriphos <sup>4)9)</sup>	ja ja ja nein ja	ja ja ja nein ja	I I I I II	insgesamt max. 5 Anw. aus dieser Mittelgruppe immer in Verbindung mit einem Kontaktmittel, Frutogard und Alginure BioSchutz bis max. ES68	
Microthiol WG <sup>8)</sup>	nein	nein	II	bevorzugt zum Austrieb und in die Blüte	
FytoSave <sup>4)</sup> Romeo <sup>4)</sup>	nein nein	nein nein	II I	max. 8 Anwendungen gegen alle Schaderreger max. 10 Anwendungen gegen alle Schaderreger	

## FUNGIZIDE

Indikation/Produktname	Anwendung mit		Raub- Milben- klasse <sup>1</sup>	Anwendungen	
	Hub- schrauber	Drohne		Vorblüte (ES 01-60)	Nachblüte (ES 61-81)
<b>Echter Mehltau – Oidium (<i>Erysiphe necator</i>)</b>					
Kumulus WG	ja	ja	II	bevorzugt zum Austrieb und in der Vorblüte SulfoLiq 800 SC nur bis max. ES75	
Microthiol WG	ja	ja	II		
Netzschwefel Stulln	ja	ja	II		
Netz-Schwefelit WG	ja	ja	II		
Thiovit Jet	ja	ja	II		
SulfoLiq 800 SC	nein	nein	II		
restliche Netzschwefel <sup>2)</sup>	nein	nein	II		
Collis <sup>5)</sup>	ja	ja	I	insgesamt max. 2 Anw. aus dieser Mittelgruppe gegen alle Schaderreger, Luna Experience und Luna Max max. 1 Anw. nur bis ES73	
Luna Experience <sup>5)</sup>	ja	nein	II		
Luna Max <sup>5)</sup>	nein	nein	I		
Sercadis <sup>5)</sup>	ja	ja	II		
Belanty	ja	ja	I	insgesamt max. 6 Anw. aus dieser Mittelgruppe gegen alle Schaderreger, Belanty max. 2 Anw. Galileo max. 2 Anw. nur bis ES79, Custodia max. 1 Anw. Luna Experience max. 1 Anw. nur bis ES73 Dynali max. 2 Anw. Talendo Extra max. 2 Anw. bis ES 79 Sarumo max. 2 Anw. bis ES 79	
Topas	ja	ja	I		
Galileo	nein	nein	II		
Custodia	ja	nein	I		
Dynali	ja	ja	I		
Luna Experience <sup>5)</sup>	ja	nein	II		
Talendo Extra	ja	nein	I		
Sarumo	nein	nein	II		
Luna Max <sup>5)</sup>	nein	nein	I	insgesamt max. 2 Anw. aus dieser Mittelgruppe Luna Max max. 1 Anw. (nur bis ES73), Prosper Tec (nur bis ES75) und Spirox (nur bis ES71)	
Prosper Tec	nein	nein	I		
Spirox	nein	nein	II		
Talendo	nein	nein	I	insgesamt max. 2 Anw. aus dieser Mittelgruppe, Talendo Extra max. 2 Anwendungen bis ES 79	
Talios	nein	nein	I		
Talendo Extra	ja	nein	II		
Collis <sup>5)</sup>	ja	ja	I	insgesamt max. 2 Anw. aus dieser Mittelgruppe gegen alle Schaderreger, aber nur 1 x gegen Oidium	
Custodia	ja	nein	I		
Flint	nein	nein	I		
Vivando	ja	ja	I	insgesamt max. 2 Anw. aus dieser Mittelgruppe	
Kusabi	ja	ja	I		
Powdrio	ja	ja	I		
Kumar	ja	ja	III	insgesamt max. 6 Anw. aus dieser Mittelgruppe	
Vitisan	nein	nein	II		
Taegro	ja	ja	II	max. 10 Anwendungen gegen alle Schaderreger	
FytoSave	nein	nein	II	max. 8 Anwendungen gegen alle Schaderreger	
Romeo	nein	nein	I	max. 10 Anwendungen gegen alle Schaderreger	
<b>Graufäule - Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)</b>					
Cantus <sup>5)</sup>	nein	nein	I	keine	max. 1 Anwendung
Kenja <sup>5)</sup>	nein	nein	I		
Teldor	nein	nein	I	keine	insgesamt max. 1 Anw. aus dieser Mittelgruppe
Prolectus	nein	nein	II		
Switch	nein	nein	I	keine	insgesamt max. 1 Anw. aus dieser Mittelgruppe
Scala	nein	nein	I		
Pyrus	nein	nein	I		
Kumar	nein	nein	III	keine	max. 4 Anw. gegen alle Schaderreger, davon mind. 2 Anw. nur in die Trauben- zone
Botector	nein	nein	I	keine	max. 4 Anwendungen, Romeo max. 5 Anw.
Serenade ASO	nein	nein	I		
Romeo	nein	nein	I		
Taegro	nein	nein	II		

## FUNGIZIDE

Indikation/Produktname	Anwendung mit		Raub- Milben- klasse <sup>1</sup>	Anwendungen	
	Hub- schrauber	Drohne		Vorblüte (ES 01-60)	Nachblüte (ES 61-81)
<b>Esca-Erreger</b> ( <i>Phaeomoniella chlamydospora</i> , <i>Togninia minima</i> , <i>Botryosphaeria dothidea</i> ) <b>Eutypiose</b> ( <i>Eutypa lata</i> )					
Vintec	nein	nein	I	max. 2 Anwendungen zeitnah nach dem Rebschnitt	
Tessor	nein	nein	I	max. 1 Anwendungen zeitnah nach dem Rebschnitt	
<b>Schwarzfäule</b> ( <i>Guignardia bidwellii</i> )					
Belanty	ja	ja	I	insgesamt max. 2 Anw. gegen alle Schaderreger	
Topas	nein	nein	I	insgesamt max. 4 Anw. gegen alle Schaderreger	
Flint	nein	nein	I	insgesamt max. 2 Anw. gegen alle Schaderreger	
Dynali	ja	ja	I	insgesamt max. 2 Anw. gegen alle Schaderreger	
Luna Experience <sup>5)</sup> Sercadis <sup>5)</sup>	nein ja	nein ja	II II	insgesamt max. 2 Anw. aus dieser Mittelgruppe gegen alle Schaderreger, Luna Experience max. 1 Anw. gegen alle Schaderreger, nur bis ES73	
Polyram WG	ja	nein	II	insgesamt max. 3 gegen alle Schaderreger	
Cuprozin progress <sup>7)</sup>	nein	nein	I	insgesamt max. 2 Anw. gegen alle Schaderreger, siehe auch Zusatzbestimmungen	
Delan Pro <sup>4)</sup>	ja	ja	I	max. 4 Anw. gegen alle Schaderreger	

Gegen die Schwarzfäule ist darüber hinaus im Rahmen der Spritzfolgen gegen Peronospora, Phomopsis, Roter Brenner und Oidium die Zusatzwirkung der Mittel aus der Gruppe der Azole, der Strobilurine und des Dithiocarbamats zu nutzen.

<sup>1)</sup> Raubmilbenschädigung: I = nicht schädigend, II = schwach schädigend, III = schädigend

<sup>2)</sup> alle im Weinbau zugelassenen Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff

<sup>3)</sup> keine Zulassung gegen Peronospora

<sup>4)</sup> keine Zulassung gegen Phomopsis und Roten Brenner

<sup>5)</sup> zur Vermeidung von Resistenz dürfen die Boscalid- und Fluopyram-haltigen Mittel Cantus, Collis, Sercadis, Kenja, Luna Max und Luna Experience, insgesamt nicht mehr als 2 Mal ausgebracht werden (gleicher Wirkmechanismus)

<sup>6)</sup> keine Zulassung gegen Peronospora und Phomopsis

<sup>7)</sup> keine Zulassung gegen Phomopsis

<sup>8)</sup> keine Zulassung gegen Peronospora und Roter Brenner

<sup>9)</sup> Ausschließlich nur in Verbindung mit einem zugelassenen Peronospora- bzw. Schwarzfäule-Kontaktmittel verwenden

# INSEKTIZIDE

## - Keine Anwendung mit Hubschrauber oder Drohne -

Indikation/Produktname	Bienen	RM Klasse <sup>1)</sup>	Anwendungen	
			Vorblüte (ES 01-60)	Nachblüte (ES 61-81)
<b>Einbindiger Traubenwickler (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)</b>				
<b>Bekreuzter Traubenwickler (<i>Lobesia botrana</i>)</b>				
RAK 1 neu	B4	I	einmalige Anwendung durch Aushängen von 500 Ampullen je ha  2,5 Puffer je ha	
RAK 1+2 M	B4	I		
Isonet LE	B3	I		
CheckMate Puffer LB/EA	B3	I		
Bacillus thuringiensis-Mittel <sup>2)</sup>	B4	I	insgesamt max. 6 Anw. gegen alle Schaderreger	
Mimic <sup>3)</sup>	B4	I	insgesamt max. 3 Anw. gegen alle Schaderreger	
SpinTor <sup>4)</sup>	B1	I	insgesamt max. 4 Anw. gegen alle Schaderreger	
Coragen	B4	I	insgesamt max. 1 Anw. gegen alle Schaderreger	
<b>Springwurm (<i>Sparganothis pilleriana</i>)</b>				
<b>Rhombenspanner (<i>Peribatodes rhomboidaria</i>)</b>				
Mimic <sup>3)</sup>	B4	I	insgesamt max. 3 Anw. gegen alle Schaderreger	
SpinTor <sup>4)</sup>	B1	I	insgesamt max. 4 Anw. gegen alle Schaderreger	
<b>Spinnmilben (<i>Acari</i>)</b>				
Paraffinöle / Rapsöle <sup>2)</sup>	B4	I	insgesamt max. 1 Anw. gegen alle Schaderreger	
Kiron	B4	I	max. 1 Anw. und nur bei Überschreiten der wirtschaftlichen Schadensschwelle	
<b>Kräuselmilbe (<i>Calepitrimerus Nalepa</i>)</b>				
<b>Blattgallmilbe (<i>Colomerus vitis</i>)</b>				
Thiovit Jet	B4	II	nur zu Austriebs- und Vorblütebehandlung	
Paraffinöle <sup>2)</sup>	B4	I		
Rapsöle <sup>2)</sup>	B4	I		
<b>Grüne Rebzikade (<i>Empoasca vitis</i>)</b>				
Kiron	B4	I	max. 1 Anw. und nur bei Überschreiten der wirtschaftlichen Schadensschwelle	
<b>Ohrwurm (Dermaptera)</b>				
SpinTor <sup>4)</sup>	B1	I	max. 1 Anw. und nur bei Überschreiten der wirtschaftlichen Schadensschwelle	
<b>Schildlaus-Arten</b>				
Para Sommer	B4	I	max. 1 Anw. zur Austriebsbehandlung	
Micula	B4	I	max. 1 Anw. zur Austriebsbehandlung	
Movento SC 100	B1	III	max. 2 Anwendungen gegen alle Schaderreger	
<b>Thripse (Drepanthrips reuteri)</b>				
SpinTor <sup>4)</sup>	B1	I	max. 1 Anw. und nur bei Überschreiten der wirtschaftlichen Schadensschwelle	
<b>Drosophila-Arten</b>				
SpinTor <sup>4)</sup>	B1	I	max. 2 Anwendungen	
Mospilan	B4	II	max. 1 Anwendung	
Minecto One	B1	III	max. 1 Anwendung	
<b>Eulenarten</b>				
Mimic <sup>3)</sup>	B4	I	max. 3 Anw. und nur bei Überschreiten der wirtschaftlichen Schadensschwelle	

# INSEKTIZIDE

## - Keine Anwendung mit Hubschrauber oder Drohne -

Indikation/Produktname	Bienen	RM Klasse <sup>1)</sup>	Anwendungen	
			Vorblüte (ES 01-60)	Nachblüte (ES 61-81)
<b>Reblaus</b>				
Movento SC 100	B1	III	max. 2 Anwendungen gegen alle Schaderreger	

<sup>1)</sup> Raubmilbenschädigung: I = nicht schädigend, II = schwach schädigend, III = schädigend

<sup>2)</sup> alle im Weinbau zugelassenen Pflanzenschutzmittel mit ausschließlich diesen Wirkstoffen

<sup>3)</sup> jedes dieser Mittel darf pro Vegetationsperiode in maximal 3 Anwendungen eingesetzt werden

<sup>4)</sup> jedes dieser Mittel darf pro Vegetationsperiode in maximal 4 Anwendungen eingesetzt werden

### Lockerung des Traubenstielgerüstes:

**FlorGib Tablets** und **Gibb 3** (Gibberellinsäure) zur Lockerung des Stielgerüstes und zur vorbeugenden Behandlung von Essigfäule und Botrytis an Keltertrauben. Einmalige Anwendung nur in den vom Vertreiber empfohlenen Sorten mit max. 16 Tabletten je ha.

**Regalis Plus** (Wirkstoff Prohexadion Calcium) zur Lockerung des Traubenstielgerüstes und zur vorbeugenden Behandlung von Essigfäule und Botrytis an Keltertrauben. Einmalige Anwendung nur in den vom Vertreiber empfohlenen Sorten mit max. 1,8 kg/ha.

**Berelex 40 SG** (Gibberellinsäure) zur Lockerung des Stielgerüstes und zur vorbeugenden Behandlung von Essigfäule und Botrytis an Keltertrauben. Einmalige Anwendung mit 50 g/ha.

### Zusatzbestimmungen:

- ◆ Alle im Weinbau zugelassenen Herbizide dürfen entsprechend ihren Anwendungsbestimmungen eingesetzt werden.
- ◆ Mittel, die nach Erscheinen dieser Liste regulär zugelassen werden, dürfen nach Empfehlung der staatlichen Rebschutzberatung eingesetzt werden.
- ◆ Mittel die nach Art. 53 (Notfallzulassung) für einen bestimmten Zeitraum zugelassen werden und in dieser Liste nicht aufgeführt sind, können aber bei Bedarf auch eingesetzt werden.
- ◆ Es gelten die Auflagen und die Anwendungsbestimmungen der regulären Zulassung einzuhalten.
- ◆ **Restbestände:**  
Restbestände von Mitteln, die in den Vorjahren in vorliegender Liste aufgeführt waren, dürfen noch 18 Monate nach Ablauf der Zulassung eingesetzt werden, sofern kein Anwendungsverbot besteht.
- ◆ **Mittel mit Anwendungsverbot:**  
**Achtung!** Mittel für die ein Anwendungsverbot verhängt wurde, dürfen nicht mehr eingesetzt werden!
- ◆ **Mittel für ökologische Spritzfolgen:**  
**Kupfermittel:** Bei Behandlung mit niedrigerer Dosierung (mit verminderter Wirksamkeit) kann die maximale Zahl der Behandlungen erhöht werden, solange der für die Kultur und das Jahr vorgesehene Gesamtmittelaufwand nicht überschritten wird. Weiterhin sind die Vorgaben der Öko-Weinbau-Verbände (Reinkupfermenge 3 kg/ha und Jahr) einzuhalten.
  - **Kupferhydroxid** (Zulassungs-Nr. 06896-XX, z.B. Funguran progress und Zulassungs-Nr. 006895-XX z.B. Cuprozin progress) darf max. mit dem nach Entwicklungsstadium zugelassenen Mittelaufwand und mit max. 3 kg Reinkupfer pro ha und Jahr angewendet werden.
  - **Kupfersulfat** (Zulassungs-Nr. 033775-XX, z.B. Cuproxat) darf max. mit dem nach Entwicklungsstadium zugelassenen Mittelaufwand und mit max. 3 kg Reinkupfer pro ha und Jahr angewendet werden.
- ◆ **Mittel auf Basis von Kaliumhydrogencarbonat (Kumar, Vitsan):** bis zu 6 Anwendungen möglich aufgrund eingeschränkter Mittelauswahl gegen Oidium.